

サツキ分解促進剤

こうそ 酵素ちゃん

サツキ分解・発根の促進!!
芝草の黄化現象の改善!!
土壌pH・環境の調整!!!

NET : 15kg (2.5kg×6袋)

Lot No.

使用方法 : グリーン/1タンクに2.5~5kg投入。 1L散布(2.5~5g/m²)
FW・ラフ/1タンクに2.5~5kg投入。 200cc散布(0.5~1g/m²)

内容成分 : Feとして20~30%, その他

pH : 3.7±0.5(400倍希釈液) ※ 使用する水によってはこの限りではありません。

高純度な酵素を
大切な芝草へ!!

Fe enzyme

タンク内での溶けが早いので
効率良い作業が可能に!!



危険



【危険有害性情報】

- 飲み込むと有害
- 皮膚に接触すると生命に危険

【安全対策】

- 取り扱い後は手をよく洗うこと。● この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
- 眼、皮膚、衣類につけないこと。● 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急処置】

- 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。● 口をすすぐこと。
- 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。
- 汚染された衣類を直ちにすべて脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

【保管】

- 施錠して保管すること。

【廃棄】

- 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

【その他の注意】

- 目に入ると炎症を起こすことがあります。● 目に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
- のど、鼻などを刺激する場合、皮膚にかゆみを生じる場合がありますので注意してください。● 飲まないでください。
- 希釈する際はまず水をはり、その中にかき混ぜながら製品を入れてください。
- 微粉末のため、混合の際には飛散に注意してください。● 作業後は頭、手足などを石けんでよく洗うがいをしてください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。● 不明な点がありましたら、安全データシート (SDS) を参照してください。
- ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。
- 直射日光を避け、冷暗所 (30℃以下) に保管してください。

総販売元



有限会社 エスケージ

〒252-0331

神奈川県相模原市南区大野台1-9-6

TEL:042-707-7261