

芝草の総合殺菌剤

エーツージ[®]

®は住友化学(株)の登録商標

A to Z

ラージパッチの予防と治療
判断のむずかしい病害でお困りのときに!

疑似葉腐病(象の足跡)

葉腐病(ラージパッチ)

カーブラリア葉枯病



住化グリーン株式会社

特長

1

日本芝の病害に
幅広く効果を発揮します。

2

作用性の異なる
2つの有効成分により、
ダブルで効果を発揮します。

3

浸透移行性があり、
予防効果だけでなく
治療効果も有します。

4

粉立ちを抑え
使いやすい
顆粒水和剤です。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フラメトピルを 含む農薬の 総使用回数	メトコナゾールを 含む農薬の 総使用回数
		薬量	希釈水量					
日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	0.1~0.2g/m ²	0.2ℓ/m ²	発病初期	2回以内	散布	2回以内	6回以内
	疑似葉腐病(春はげ症) ネクロティックリングスポット病	0.1g/m ²		休眠期前				
	疑似葉腐病(象の足跡) カーブラリア葉枯病 立枯病(ゾイシアデクライン)		0.4ℓ/m ²	発病初期				
	フェアリーリング病	0.2g/m ²						
日本芝 (こうらいしば)	ダラースポット病	0.2g/m ²	0.2ℓ/m ²					

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液の調製は、まず本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌してください。
- 周辺の作物にかかると薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように十分注意して散布してください。

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は、手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔してください。

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園などで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管:密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
http://www.sumika-green.jp