

環境にやさしい除草剤

【使用方法】

倍率	通常	ササ類・つる類	スギナ	散布面積
水量	100倍	50倍	25倍	エイトアップの量
1L	10ml	20ml	40ml	3坪・10㎡
4L	40ml	80ml	160ml	12坪・40㎡
5L	50ml	100ml	200ml	15坪・50㎡
6L	60ml	120ml	240ml	18坪・60㎡
10L	100ml	200ml	400ml	30坪・100㎡

【使用場所】

庭・駐車場・公園・宅地・道路・運動場・堤とう・のり面・鉄道等

農耕地:
 野菜類・麦類・豆類（は種・定植前の雑草処理）
 果樹類（樹幹周りの雑草処理）
 水田（耕起前、刈跡、畦畔などの雑草処理）

根まで枯らし土にも安心



散布器具により 散布面積は変わります。

希釈液1Lでの散布可能な面積



ジョーロ
3坪 9.9㎡



噴霧器
7.5坪 24.7㎡



少量散布ノズル
9坪 30㎡

環境に配慮したエコロジー設計

大きく使ってゴミは小さく



エイトアップ®液剤は、安心・安全・安価なジェネリック**除草剤**です。
 農業経営などの経費削減にお役立てください。

発売元 **株式会社 シー・ジー・エス**

〒369-1245 埼玉県深谷市荒川909
 TEL (048)579-0451 / FAX (048)579-0455
<http://www.cgs-inc.co.jp>

お客様相談センター ☎ **0120-091-611**

平日/月～金曜日 9:00～17:00 (左記以外は音声による簡易説明となります。)

A3-001 H26.06.10,000



雑草にお困りなら

除草剤 エイトアップ® 液剤 8

根までしっかり枯らします。

【農林水産省登録 第18815号】

500ml 1本で約150坪(500㎡)以上散布できます。

●有効成分 グリホサートイソプロピルアミン塩…41.0% 水・界面活性剤等…59.0%

豊富なバリエーション



1ケース/20本入 1ケース/12本入 1ケース/6本入 1ケース/6袋入



1ケース/3本入 1ケース/3箱入 1ケース/1本入 1ケース/1本入

樹木周りにも使えます。



強力!しかも環境にやさしい



水で薄めて散布するだけ



残留や土壌汚染がないので、
 枯れた後に種まき、苗の植付けも可能です。

希釈液の作り方 (※キャップ容量: 10mlです。)



通常
100倍
希釈

キャップ
1杯分



ササ類・つる類
50倍
希釈

キャップ
2杯分




スギナには
25倍
希釈

キャップ
4杯分





適用場所、適用雑草および使用量（農薬取締法による表記）



作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数					
				薬量(mL)	希釈水量(L)								
果樹類 (かんきつを除く)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	250 500	通常散布 50~100	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内					
		多年生雑草		500 1000									
かんきつ		一年生雑草		250 500	通常散布 50~100 少量散布 25~50			5回以内					
		多年生雑草		500 1000									
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	250 500		2回以内		2回以内					
		多年生雑草		500 1000									
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250 500				1回					
		多年生雑草		500 1000									
水田作物 (水稲を除く)	—	一年生雑草	耕起20~10日前まで (雑草生育期)	250 500	50 100	1回		雑草茎葉散布	耕起栽培は2回以内 (耕起前は1回以内) 乾田不耕起栽培は2回以内				
移植水稻													
直播水稻						耕起7日前まで (雑草生育期)			3回以内		3回以内		
麦類 (小麦を除く)		多年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期)	500 750			3回以内						
小麦													
雑穀類		一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)	250 500	100	1回	2回以内						
野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、なすを除く)							1回		1回				
だいこん									3回以内	2回以内			
トマト きゅうり なす													
ねぎ						3回以内			3回以内				
たまねぎ							少量散布 25~50			100			
							耕起7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)			少量散布 25~50	100		
えだまめ							耕起又は定植7日前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)			少量散布 25~50	100		
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)						一年生雑草	は種後出芽前 (雑草生育期：草丈30cm以下)		少量散布 25~50	2回以内	2回以内		
	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)												

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当たりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量 (ml)	希釈水量 (L)			
だいず	—	一年生雑草	は種10日以前 (雑草生育期)	250 500	少量散布 25~50	2回 以内	雑草茎葉 散布	4回以内
かんしょ			は種後出芽前まで (雑草生育期：草丈30cm以下)		100	1回		2回以内
茶			耕起前 (雑草生育期)					
さとうきび	圃場内の 周縁部	多年生雑草	摘採7日前まで (雑草生育期)	500 1000	少量散布 25~50	2回 以内		雑草木 茎葉散布
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	一年生雑草	更新・造成の 10日以前 (雑草生育期)		500 1000		50	
		多年生雑草		250 500				
		一年生及び 多年生雑草	は種10日前～ は種当日 (耕起整地後)(雑草発生前期)	250 500				
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、 ササ類等の 多年生雑草 落葉雑かん木	生育盛期以降 (夏～秋期)	1000	30	1回	雑草木 茎葉散布	1回
樹木等	公 園 庭 園 堤とう 駐車場 道 路 運動場 宅 地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	500	100	3回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000				
		スギナ	雑草生育期	2000	50~100			

作物名	適用場所	適用 雑草名	使用 時期	希釈 倍数	使用液量		本剤の 使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の 総使用回数
					つる径(cm)	使用量(ml/株)			
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育 初期	原液又は 2倍液	2cm以下 2.1～3.0cm 3.1～4.0cm 4.1～5.0cm 5.1cm以上	0.5ml/株 1.0ml/株 1.5ml/株 2.0ml/株 適宜増量	1回	つる注入 処理	1回
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5～10ml/本			竹稈注入 処理	

- 面積** 10アール=300坪=991㎡
- 一年生雑草** 雑草の種が落ち育成し、一年以内に枯れるもの。
- 多年生雑草** 雑草の種が落ち育成し、越冬し翌年も生えるもの。
- 樹木等** 植木や街路樹など植えてある周辺。
- 少量散布** 少量散布用ノズルを装着する事で、泡状になって雑草に付着するので散布水量を大幅に減らす事ができる。
- つる注入処理** つるにナタなどで傷をつけ又はドリルで穴をあけ、油差などで注入して下さい。

