

農林水産省登録 第13870号

成分：ACN25%

魚毒：B類相当

安全性：毒物・劇物に該当しない(普通物)



芝の藻・コケ防除に

キレター[®]



®：登録商標



アグロ カネショウ株式会社
東京都港区赤坂4-2-19

AJ10G04(キレ1)

コケの専用防除剤

キレター®

ACN水和剤

特長

- 光合成阻害作用によりコケ類・藻類を速効的に枯らします。
- ゴルフ場、運動場、公園などの日本芝(こうらいしば)・西洋芝(ベントグラス)にも使用できます。

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝(こうらいしば)	—	藻類 コケ類	藻類・コケ類の発生時	3~4kg/10a (3~4g/m ²)	200~300 ℓ/10a	3回以内	散布 (噴霧器)	3回以内
西洋芝(ベントグラス)		コケ類	冬期芝生育期 (コケ類の発生時)	2~4kg/10a (2~4g/m ²)				
樹木等	公園 庭園 宅地 駐車場 運動場 道路等	ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期	2kg/10a (2g/m ²)	100~300 ℓ/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に噴霧器で雑草茎葉散布	3回以内
					500~1000 ℓ/10a (500~1000 mℓ/m ²)		植栽地を除く樹木等の周辺地にじょうろで雑草茎葉散布	

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	使用方法
つつじ類(鉢植え)	ゼニゴケ	ゼニゴケ生育期	500倍	鉢内土壌表面積1㎡当り1ℓ	散布

平成22年7月15日現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤の所要量を所定量の水に加えてよく攪拌し、じょうろ又は噴霧器でコケ類、藻類に十分かかるように散布する。
- さつき、つつじにかかると薬害を生ずる場合があるので、直接かからないように注意して散布する。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等にかからないように散布する。
- 使用後のじょうろや噴霧器は十分水で洗っておく。
- 調製した散布液はなるべく早く使用する。
- 公園、庭園等で使用する場合、特に以下のことに注意する。
 - ①激しい降雨の予想される場合は使用を避ける。
 - ②本剤の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生ずることのないよう十分注意して散布する。
 - ③水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。
 - ④散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 西洋芝に対して薬害を生ずるおそれがあるので、高温時に使用しない。

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑業にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 使用上の注意

- 眼に入らないよう注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。(刺激性)
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- 公園、庭園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。
- 水産動物に影響があるので、養殖池等周辺での使用はさける。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。