

モノドクター[®]フロアブル

藻類発生時でもシャープな効果 炭疽病の同時防除も可能



藻類の発生初期から生育盛期まで優れた効果を発揮するとともに、藻類の発生を長く抑制します。

一般名	ジラム水和剤
登録番号	第23718号
有効成分	ジラム 40% (PRTR・1種)
系統	有機硫黄系
作用機作	多作用点接触活性阻害
性状	類白色水和性粉末 63μm以下
毒性	普通物*
包装	2ℓ×6
有効年限	4年

*毒劇物に該当しないものを指していう通称

対象作物
適用場所

● ベントグラス

特長

- グリーン上の手ごわい生育盛期の藻類に対しても有効です。
- すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。
- ベントグラスの重要病害である炭疽病の同時防除も可能です。
- 少水量散布機での散布が可能です。
- 水溶性パックの内袋の採用で投入時の粉立ちが少なくなりました。

登録内容

作物名	適用病害虫名 適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用方法	ジラムを含む 農薬の総使用回数
			薬量	希釈倍数			
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病	発病初期	3~4ml/m ²	200ml/m ²	8回以内	散布	8回以内
	かさ枯病						
	藻類	芝生育期 (藻類生育期)	2~4ml/m ²				



藻類(モノドクター処理区)



藻類(ノストック・コムネ)



炭疽病



藻類(フォルミジウム)

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤及びボルドー液との混用はさけてください。また、無機銅を含む剤との混用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 夏期高温時に連用散布すると薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。

- 液肥類、特にアルカリ性の葉面散布液肥との併用は、軽微な葉色の変化を生じる場合があるので注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等

に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 魚毒性等：水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管：直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。