

農林水産省登録 第21267号

500ml入

# モリエート<sup>®</sup>SC

マツノマダラカミキリから  
大切な松を守る!!



## 環境にやさしい6つの特性

- 優れた後食防止効果
- フロアブル製剤
- 普通物・魚毒A類
- 臭いが少ない製剤
- 汚染問題が少ない
- 少量でコンパクト

 ヤシマ産業株式会社  
Yashima

マツノマダラカミキリから大切な松を守る

殺虫剤


500mL入

モリエート<sup>®</sup>sc

クロチアニジン水和剤

成分:クロチアニジン .....30.0%  
(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-  
3-メチル-2-ニトログアニジン  
水、界面活性剤等 .....70.0%

性状:類白色水和性粘稠懸濁液体



■適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤及びクロチアニジンを含む農薬の総使用回数	使用方法
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ 成虫	1,000倍	3L/本 (樹高10m)	成虫の発生初期 及び 発生最盛期直前	4回以内	散布

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前にはよく振って使用する。
- マツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生直後又は発生初期に時期を失しないように散布し、更に20日後(成虫発生最盛期直前)にもう一度散布すると効果的である。
- 散布液量は、樹高10mのまつ1本あたり3Lを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面散布する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 激しい降雨の予想される場合は使用を避ける。

⚠ 安全使用上の注意

- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 桑園がある地域では使用しない。(蚕毒)
- ミツバチを放飼している地域では使用を避ける。  
魚毒性…通常の使用方法では該当がない。  
保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して冷涼な所。



- ラベルを良く読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切る。
- 空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し(洗浄水はタンクに入れる)、適切に処理する。

製造元  住友化学工業株式会社  
東京都中央区新川2-27-1

販売元  ヤシマ産業株式会社  
神奈川県川崎市高津区二子6-14-10