

枯らす！叩く！

2つの効果で鋭く抑える！

茎葉処理効果

土壤処理効果



芝用除草剤

ロンセイバー[®]

発生前の雑草にも
効果があります

土壤処理・試験方法

6/29 ポットに土壌を入れロンセイバーを処理
7/14 処理15日後に雑草の種を播種
9/10 各ポットの雑草の発生を調査



住化グリーン株式会社

特長

1

2つの処理効果

茎葉処理効果と土壤処理効果をあわせ持ち、雑草の発生を長く抑えます。

2

カタバミ、チドメグサ、ヒメクグに優れた効果

その他、一年生と多年生の広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムがあります。

3

ベントグラスに対して安心して使用できます

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝(こうらいしば)	メヒシバ	春夏期芝生育期 (メヒシバ発生前)	0.1~0.2 g/m ²	200~300 mℓ/m ²	2回以内	全面土壤散布	3回以内
	コケ類	春夏期芝生育期 (雑草発生初期)				雑草茎葉散布 又は 全面土壤散布	
日本芝	ヒメクグ	芝生育期 (雑草発生前~発生初期)	0.1~0.2 g/m ²	200~300 mℓ/m ²	2回以内	全面土壤散布	3回以内
	一年生及び 多年生広葉雑草						
西洋芝(ベントグラス)		春夏期芝生育期 (雑草発生前~発生初期)					

殺草スペクトラム(土壤処理)

雑草名	ロンセイバー処理量(g/m ²)			
	0.1	0.15	0.2	
キク科	ウラジロチチコグサ	□	○~○	○~○
	トキンソウ	○~●	●	●
	セイヨウタンポポ	○~●	●	●
	ヒメムカシヨモギ	○~●	○~●	●
	ハキダメギク	●	●	●
	ヒメジョオン	○~●	○~●	●
ナデシコ科	ツメクサ	●	●	●
タデ科	イヌタデ	●	●	●
トウダイグサ科	コニシキソウ	□~○	□~○	○~●
マメ科	コメツヅツメクサ	○~●	●	●
	ヤハズソウ	○	○	●
カタバミ科	カタバミ	○~●	●	●
セリ科	チドメグサ	○~●	○~●	○~●
ナス科	ワルナスピ	●	●	●

防除価 ●:100 ○:99~95 ○:94~90 □:89~70 △:69~50 ×:49以下

△効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 本剤は雑草発生前から発生初期に有効なので、時期を失しないように散布してください。
- イネ科雑草に効果が劣るので、イネ科雑草の多い場合はこれに有効な土壤処理剤との混用または体系で使用してください。
- 敷布の際は芝生の付近にある草花や花木、畠作物などに薬液がかからないように注意してください。
- 張り芝直後の芝には使用しないでください。
- 敷布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 敷布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：密封し、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼・乾燥した所。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。




住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
 TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
<http://www.sumika-green.jp>